

مدفوع

رایج ترین کاربرد آزمایش مدفوع تشخیص انواع مختلف انگل های بیماریزا در روده است .

افرادی که تحت آزمایش مدفوع قرار می گیرند ، باید برای مدت ۷ تا ۱۰ روز پیش از انجام این آزمایش از درمان با روغن کرچک یا روغن های معدنی ، بیسموت ، منیزیم ، ترکیبات ضد اسهال ، تنقیه با باریوم و مصرف آنتی بیوتیک ها خودداری نمایند .

بهتر است این آزمایش در سه نوبت انجام شود . نمونه مدفوع باید مستقیماً در ظرفی که از طرف آزمایشگاه در اختیار بیمار قرار می گیرد جمع آوری شود . اگر بیمار بستری است . نمونه را در یک ظرف خشک جمع آوری نموده و سپس با استفاده از چوب مخصوص آبسلانگ ، نمونه را به ظرف برچسب دار منتقل نمایید . نمونه مدفوع نباید با ادرار یا آب آلوده شود زیرا ادرار می تواند برخی از انگل های فعال را از بین ببرد . بیماران باید نمونه جمع آوری شده را مخصوصاً در موارد مشکوک به اسهال خونی بلافاصله به آزمایشگاه تحویل دهند .

اگر انجام آزمایش حداکثر تا ۳۰ دقیقه پس از جمع آوری نمونه امکان پذیر نباشد لازم است تا نمونه در یخچال قرار داده شود .

آزمایشگاه پارس گناباد

www.gonabadparslab.ir



gonabadparslab

