

جمع آوری ادرار تمیز و کشت بانوان

پیش از انجام آزمایش از نوشیدن مقادیر زیاد آب و سایر مایعات اجتناب نمایید. دست های خود را کاملاً با صابون و آب شسته و به خوبی با دستمال کاغذی خشک کنید. توجه داشته باشید که:

بهترین نمونه برای تشخیص عفونت های ادراری نخستین نمونه ادرار صبحگاهی است.

درب ظرف ادرار را با احتیاط باز کنید ؛ بدون آن که دست شما با سطح داخلی ظرف یا درب آن تماس پیدا کند.

با یک دست چین های پوستی دستگاه تناسلی را از هم باز کرده و با دستمال یکبار مصرف اطراف مقعد و پیش آبراه را از جلو به عقب تمیز کنید . این کار را دو بار و هر بار با یک دستمال جدید تکرار کنید.

پس از اینکه جریان ادرار شروع شد ، قسمت اولیه ادرار (چند قطره اول) را دور ریخته و بقیه ادرار را با حجم ۳۰ میلی لیتر (حداقل نصف ظرف) جمع کنید . توجه داشته باشید که ظرف مذکور تحت هیچ عنوان با پوست اطراف ناحیه تناسلی تماس پیدا نکند . در صورت مصرف آنتی بیوتیک ، حداقل ۲۴ تا ۴۸ ساعت آنتی بیوتیک را با صلاحدید پزشک قطع نموده و سپس نمونه اخذ گردد .

درب ظرف نمونه را بسته و آن را حداکثر طی ۳۰ دقیقه تحویل آزمایشگاه دهید.

آزمایشگاه پارس گناباد

www.gonabadparslab.ir



gonabadparslab

