

خون مخفی در مدفوع

گاهی اوقات خونریزی های مختصری در بخش های مختلف دستگاه گوارش اتفاق می افتد که به علت کم بودن با چشم دیده نمی شود . بنابر این باید با روش های آزمایشگاهی تشخیص داده شود . بهتر است این آزمایش در ۳ نوبت انجام شود . برای انجام این آزمایش باید نکات زیر را رعایت نمائید:

۷۲-۴۸ ساعت پیش از آزمایش و در طی دوره جمع آوری نمونه مدفوع از خوردن گوشت قرمز ؛ گوشت سفید (مرغ و ماکیان) ماهی ، شلغم و تربچه خودداری کنید . مصرف قرص های آهن و فر فولیک ، کپسول همتینیک و ففول ، ایندومتاسین ، گلشیسین ، اسپیرین ، بروفن ، کورتون ها و ویتامین C باید ۴۸ ساعت پیش از انجام آزمایش قطع شود .

در صورت داشتن سابقه خونریزی از لثه ۴۸ ساعت پیش از انجام آزمایش از مسواک زدن و کشیدن نخ دندان اجتناب نمائید .

نمونه باید سریعاً به آزمایشگاه تحویل داده شود .

نمونه مدفوع نباید با ادرار یا سایر مواد آلوده شود .

آزمایشگاه پارس گناباد

www.gonabadparslab.ir

 [gonabadparslab](https://www.instagram.com/gonabadparslab)

